

IMPFPAN

Vollendeter Lebensmonat

Vollendetes Lebensjahr

Alter	1	2	3	4	5	6-7	11	12	13-14	15	16-23	2	3	4	5	6	7-8	9-10	11	12-14	16-17	
Vorsorge	U3		U4			U5	U6					U7	U7a	U8	U9		U10	U11		J1	J2	
RSV	Prophylaxe																					
Rotavirus		1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung																		
Wundstarrkrampf		1. Impfung	zusätzliche Dosis für Frühgeborene < 37 SSW	2. Impfung				3. Impfung								1. Auffrischimpfung fünf Jahre nach vorheriger Impfung			2. Auffrischimpfung fünf Jahre nach vorheriger Impfung			
Diphtherie																						
Keuchhusten																						
Kinderlähmung																						
Hepatitis B																						
Haemophilus influenzae B																						
Pneumokokken					1. Impfung	zusätzliche Dosis für Frühgeborene < 37 SSW	2. Impfung					3. Impfung										
Meningokokken Typ B		1. Impfung	2. Impfung						3. Impfung													
Meningokokken Typ C									Impfung													
Masern, Mumps, Röteln							1. Impfung															
Windpocken							1. Impfung			2. Impfung												
Humanes Papillomavirus (HPV)																		9.-14. Lebensjahr: 2 Impfungen im Abstand von 5-12 Monaten 15 Jahre und älter: 3 Impfungen im Schema 0-2-6 Monate				

Empfohlener Zeitraum für die Impfungen

Nachholzeitraum für alle noch nicht Geimpften bzw. für die Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Impfung in diesem Zeitraum nicht empfohlen bzw. nicht möglich